

Hôpital Pitié-Salpêtrière


# Conduites à tenir

- tableaux cliniques

Validé

Version : 2

Date : 09/03/20





**Rédaction:** M.Raux

**Validation:** E. Caumes, J. Robert, J.M. Constantin, P. Hausfater, S. Fournier, J.C. Lucet, A. Bleibtreu

**Mise en page:** P. Lalande





Les recommandations figurant dans ce document vont évoluer au cours du temps, à mesure de l'amélioration des connaissances.

Merci de vous assurer que vous disposez de la dernière version, disponible sur le site intranet.

Le terme « **soins habituels** » signifie que les soins non urgents en rapport avec le motif de venue peuvent être réalisés

Se référer à la définition à jour des cas possibles et avérés, disponible sur le site de [Santé Publique France](#).





En cas de doute, vous pouvez contacter un médecin sénior des services suivants :

Maladies  
infectieuses et  
tropicales :  
**60-107**

Service  
d'accueil des  
urgences :  
**20-208**

Pneumologie :  
**27-935**

Réanimation  
EOLE :  
**27-931**



# 1- Personnel hospitalier

*Asymptomatique*

## Personnel hospitalier asymptomatique contact étroit<sup>1</sup> protégé de cas

- Pas de port de masque

- Pas de dépistage

- Pas d'éviction

Car protégé lors du contact

<sup>1</sup> Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats.

## Personnel hospitalier asymptomatique contact étroit<sup>1</sup> non protégé de cas

- Masque chirurgical pendant les 14 jours qui suivent le jour de contact du/des cas
- Pas de dépistage
- Pas d'éviction, travail possible selon conditions définies par le HCSP<sup>2</sup>
- Surveillance clinique

<sup>1</sup> Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats.

<sup>2</sup> Se signaler auprès de la direction générale de son établissement, porter un masque chirurgical en permanence et le changer régulièrement et s'auto-surveiller (prise de température deux fois par jour et identification de tout symptôme). En cas de symptômes, même de faible intensité, l'éviction professionnelle doit être immédiate et un prélèvement à visée diagnostique doit être réalisé rapidement et prioritairement

## Personnel hospitalier asymptomatique ayant séjourné dans une zone à risque

- Masque chirurgical pendant les 14 jours qui suivent le retour de zone à risque
- Pas de dépistage
- Pas d'éviction, travail possible selon conditions définies par le HCSP<sup>2</sup>
- Surveillance clinique

<sup>1</sup> Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats.

<sup>2</sup> Se signaler auprès de la direction générale de son établissement, porter un masque chirurgical en permanence et le changer régulièrement et s'auto-surveiller (prise de température deux fois par jour et identification de tout symptôme). En cas de symptômes, même de faible intensité, l'éviction professionnelle doit être immédiate et un prélèvement à visée diagnostique doit être réalisé rapidement et prioritairement



# 1- Personnel hospitalier

## *Symptomatique*

## Personnel hospitalier symptomatique

- Fièvre OU infection des voies aériennes hautes ou basses (toux)

- Masque chirurgical
- Précautions gouttelettes et contact
- Dépistage
- Isolement en attente du résultat, éviction en cas de positivité
- Surveillance clinique

## 2- Patient non hospitalisé

*Asymptomatique*

## • • • Patient asymptomatique • • • ayant séjourné dans une zone à risque, non protégé

- Pas de dépistage
- Pas de confinement
- Surveillance clinique

<sup>1</sup> Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats

## • • • Patient asymptomatique contact non étroit<sup>1</sup>, non protégé de cas • • •

- Pas de dépistage
- Pas de confinement
- Si possible télétravail
- Surveillance clinique

<sup>1</sup> Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats

## • • • Patient asymptomatique contact étroit de cas<sup>1</sup> non protégé • • •

- Pas de dépistage
- Pas de confinement
- Si possible télétravail
- Surveillance clinique

<sup>1</sup> Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats

## • • • Patient asymptomatique dépisté COVID • • •

- Découverte après dépistage de positivité COVID-19 chez un patient sain, sans aucun signe clinique
  - Dépistage chez un contact étroit (soignant non protégé, proche...)
  - Patient COVID-19 sortant d'hospitalisation
- 
- Confinement à domicile jusqu'à 14 jours après le début des symptômes
  - En cas d'impossibilité de confinement pour raisons environnementales ou psycho-cognitives, confinement collectif
  - Suivi par plateforme COVIDOM

# 2- Patient non hospitalisé

## *Symptomatique*



## • • • Patient symptomatique non exposé • • •

- Fièvre ET (toux ou infection des voies aériennes)

■ Pas de dépistage

■ Confinement

■ Prise en charge ambulatoire

## • • • Patient symptomatique ayant séjourné dans une zone d'exposition ou exposition étroite<sup>1</sup> à un cas • • •

- Fièvre ET (toux ou infection des voies aériennes)
- Pas de dépistage en l'absence de critère d'hospitalisation
- Port de masque
- Isolement
- Surveillance clinique

<sup>1</sup> Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats

## • • • Patient symptomatique dépisté COVID-19 • • •

- ▶ **Pneumopathie aiguë communautaire**
  - ▶ **Hypoxémiante, oxygéo-requérante ( $\text{SpO}_2$  à l'air < 98% et fréquence respiratoire > 22.min<sup>-1</sup>)**
  - ▶ **ou sur terrain fragilisé :**
    - Age > 70 ans (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée ou plus attentive)
    - Insuffisance rénale chronique dialysée
    - Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
    - Cirrhose ≥ stade B
    - Diabète insulino-dépendant ou requérant compliqué (micro ou macro angiopathie)
    - Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique qui peut décompenser pendant une infection virale
    - Immunodépression (médicamenteuse, VIH non contrôlé ou  $\text{CD4} < 200/\text{mm}^3$ )
    - Greffe d'organe
    - Hémopathie maligne
    - Cancer métastasé
    - Tabagisme
- **Hospitalisation avec précautions gouttelettes et contact<sup>3</sup> en unité COVID-19**

- **Contacter l'infectiologue**

# 3- Patient hospitalisé pour une autre raison que COVID-19

*Asymptomatique sur le plan respiratoire*

## • • • Patient asymptomatique ayant séjourné dans une zone à risque, non protégé • • •

- Pas de dépistage
- Pas de mesure de protection
- Soins habituels
- Surveillance clinique

- **Patient asymptomatique contact non étroit<sup>1</sup> de cas, non protégé**

- Pas de dépistage
- Isolement contact et gouttelettes
- Soins habituels
- Surveillance clinique

<sup>1</sup> Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats

## • • • Patient asymptomatique **contact étroit<sup>1</sup>** de cas, • • • non protégé

- Pas de dépistage
- Précautions gouttelettes et contact pendant 14 jours suivant le contact avec le cas
- Soins habituels
- Surveillance clinique

<sup>1</sup> Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats

## • • Patient asymptomatique dépisté COVID-19 • •

► Dépistage chez un contact étroit (soignant non protégé, proche...)

- Précautions air et contact
- Isolement en unité COVID-19 sauf si la symptomatologie ne le permet pas
- Contacter l'infectiologue (numéro en diapositive 3)



# 3- Patient hospitalisé pour une autre raison que COVID-19

*Symptomatique sur le plan respiratoire*

## • • • Patient symptomatique non exposé • • •

- Fièvre ET (toux ou infection des voies aériennes)
- Pneumopathie
- Détresse respiratoire fébrile d'allure infectieuse

### ■ Dépistage

### ■ Précautions gouttelettes et contact

### ■ Soins habituels

### ■ Surveillance clinique

## • • • Patient symptomatique ayant séjourné dans une zone d'exposition ou exposé à un cas de manière non étroite<sup>1</sup> • • •

- Fièvre ET (toux ou infection des voies aériennes)
- Pneumopathie
- Détresse respiratoire fébrile d'allure infectieuse

### ■ Dépistage

### ■ Précautions gouttelettes et contact

### ■ Soins non urgents reportés

### ■ Surveillance clinique

<sup>1</sup> Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats

## • • • Patient symptomatique exposé à un contact de manière étroite<sup>1</sup> • • •

- Dépistage
- Précautions gouttelettes et contact jusqu'à obtention du résultat
- Soins non urgents reportés
- Adapter la prise en charge selon le résultat de la PCR

<sup>1</sup> Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats

## • • • Patient symptomatique dépisté COVID-19 • • •

*Pneumopathie aiguë communautaire*

- ▶ **hypoxémiante oxygéo-requérante ( $\text{SpO}_2$  à l'air < 98% et fréquence respiratoire > 22.min<sup>-1</sup>)**
- ▶ **ou sur terrain fragilisé :**
  - Age > 70 ans (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée ou plus attentive)
  - Insuffisance rénale chronique dialysée
  - Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
  - Cirrhose ≥ stade B
  - Diabète insulino-dépendant ou requérant compliqué (micro ou macro angiopathie)
  - Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique qui peut décompenser pendant une infection virale
  - Immunodépression (médicamenteuse, VIH non contrôlé ou  $\text{CD4} < 200/\text{mm}^3$ )
  - Greffe d'organe
  - Hémopathie maligne
  - Cancer métastasé
  - Tabagisme
- **Hospitalisation avec précautions gouttelettes et contact<sup>3</sup> en unité COVID-19**

- **Contacter l'infectiologue**

# 4- Masques

# Coronavirus COVID-19

## Quel masque ? Pour qui ? Dans quelle situation ?

Version au 6 mars 2020

### Qui porte un masque chirurgical?



- Personne, **soignant ou patient**, présentant des signes d'infection respiratoire : toux, rhume, syndrome grippal, avec ou sans fièvre...

**NB : Les personnels sont vigilants pour s'assurer que tout patient qui présente des signes d'infection respiratoire porte un masque chirurgical.**

- Personnels prenant en charge un patient qui présente des signes d'infection respiratoire, y compris les cas confirmés COVID-19.
- Personnels d'accueil en contact direct et rapproché des patients en l'absence de vitre de protection (entrée de l'hôpital, agents de la Gestion Administrative des Patients, services d'urgences, accueil des consultations, des HDJ et des services d'hospitalisation...)
- Personnels identifiés comme contact d'un cas confirmé COVID-19 (dans les 14 jours qui suivent le dernier contact avec le cas), ou revenant d'une zone à risque. (Cf. annexe 1)
- Personnels réalisant des actes en grande proximité avec la sphère ORL des patients : soins bucco-dentaires, examen ophtalmologique, examen ORL...
- Au cas par cas et en lien avec le service de santé au travail, personnels ayant une pathologie chronique.
- Patients immunodéprimés lors de consultations, HDJ ou déplacements dans l'hôpital.

### Qui porte un masque FFP2?



Vérifier l'étanchéité : réaliser un fit-check

- Personnels réalisant des manœuvres respiratoires à risque (exemple : prélèvement naso-pharyngé à la recherche de COVID-19, intubation, aspiration trachéale, VNI...) à des patients confirmés COVID-19 ou cas possibles, notamment ceux présentant une détresse respiratoire aiguë non expliquée.
- Personnels travaillant en contact d'un patient en précautions « Air » : tuberculose, rougeole, varicelle.

### Dans toutes les situations

- Ne pas toucher le masque une fois en place. Réaliser une FHA des mains avant la pose et après le retrait ;
- Désinfection des mains par friction hydro-alcoolique, avant et après chaque contact avec un patient ;
- Port de lunettes pour tout soin avec risque de projection oculaire de liquides biologiques ;
- Port de gants pour tout risque de contact avec des liquides biologiques et FHA dès le retrait des gants.