

## SEDATION-ANALGESIE en réanimation COVID

### HYPNOVEL– SUFENTANIL dans même seringue

#### Préparation seringue de 50 ml

Volume total de 50 ml avec 100 mg (20 ml) de midazolam +250 µg (5ml) de sufentanil + 25 ml de chlorure de sodium

#### DILUTION

Hypnovel 2mg/ml

Sufentanil 5µg/ml

Vitesse seringue	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
dose hypnovel (mg)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dose de sufentanil (µg)	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40

#### Surveillance /4 h score RASS

+5	agressif	violent, dangereux
+3	très agité	arrache tube et cathéter
+2	agité	nombreux mouvements sans but, lutte contre le respirateur
+1	anxieux	anxieux, craintif sans mouvements brutaux ni agressifs
0	éveillé et calme	
-1	assoupi	pas complètement éveillé mais répond à l'appel et garde yeux ouverts > 10 sec.
-2	sédation légère	bref éveil à l'appel avec ouverture des yeux et contact < 10sec.
-3	sédation moyenne	mouvement ou ouverture des yeux à l'appel (sans contact des yeux)
-4	sédation profonde	pas de réponse à l'appel mais mouvement ou ouverture des yeux à la stimulation physique
-5	inévitable	aucune réponse ni à l'appel, ni à la stimulation physique