

Précautions complémentaires Gouttelettes et Contact : Covid-19
Hospitalisation (complète, HDJ) – Séances (dialyse, hémobiothérapie)

Date d'application : mars 2020

Réf : FTEC-0367

Version 3 : 17/03/2020

Page 1 à 2

PROBLEMATIQUE	Indications	Patient suspect ou confirmé de Covid-19
	Réservoir	Voies respiratoires : sécrétions pharyngées et bronchiques Excrétions biologiques : selles diarrhéiques
	Voies de transmission	Respiratoire Conjonctive Mains, matériel et environnement contaminés
	Durée des mesures	Selon avis infectiologue, praticien en hygiène, médecin du travail
ORGANISATION	Chambre/box	Chambre/box individuel obligatoire, porte fermée, sanitaires non partagé Chambre/box avec renouvellement d'air traditionnel ou traitement d'air (pression -) Aération fréquente (ouverture fenêtre, porte fermée) : environ 10 minutes/heure
	Information, signalétique	Visuels sur UMP, porte et intérieur chambre/box près du PHA Information systématique en cas de transfert ou déplacement du patient
	Organisation	En dernier, regroupement des activités si présence de patients Covid+ et Covid-
SOINS	Hygiène des mains	FHA à l'entrée, à la sortie de la chambre/box, entre chaque soin
	Équipement de protection individuelle	Chronologie avant d'entrer (sas ou à l'extérieur de la chambre/box) : <ul style="list-style-type: none"> - FHA - Surblouse, +/- tablier (si soins mouillants) - Lunettes de protection systématique - Coiffe - Masque chirurgical ou FFP (manœuvres respiratoires à risques) <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier l'étanchéité FFP par une inspiration forcée (fit check) - FHA - +/- gants UU (précautions standard) Chronologie à la fin des soins, à l'intérieur de la chambre/box : <ul style="list-style-type: none"> - Retrait +/-tablier, gants (si portés), surblouse, (filières DASRIa) - FHA Dans le sas ou à l'extérieur de la chambre/box : <ul style="list-style-type: none"> - Retrait masque chirurgical ou FFP - Coiffe - Lunettes de protection (filière DASRIa) - FHA Avis SF2H du 14/03/20 Le masque peut être gardé pour plusieurs patients si non manipulé ou ôté du visage, si non humide, si intègre, en absence de projection de gouttelettes infectieuses : <ul style="list-style-type: none"> - Masque chirurgical : port maximum 4 h - FFP : port maximum 8h
	Matériel de soins et consommables	Privilégier l'usage unique ou individualisation/patient : thermomètre électronique, stéthoscope, brassard à tension, bassin, haricot, pistolet, etc. Équipement partagé : limité aux actes médicaux nécessaires (ex : échographie) Consommables pas stockés dans la chambre, pas jetés après le départ du patient (sauf si souillures)
ENVIRONNEMENT	Déchets	DASRIa (contenant adapté à la nature des déchets : sac jaune, collecteur PT, fût) Pas de stockage dans la chambre : évacuer les DASRIa après chaque soin
	Selles	Utilisation des sanitaires de la chambre Bassin et urinal : <ul style="list-style-type: none"> - dédié au patient : utiliser les sacs de protection hygiénique à UU (Carebag®) - nettoyage et désinfection après chaque utilisation
	Vaisselle/repas	Plateau, vaisselle/couverts habituels, entretien en lave-vaisselle
	Linge	Tri et circuit habituels
	Bionettoyage	Au quotidien (et dès souillures) : procédure habituelle <ul style="list-style-type: none"> -Surfanios Premium® : sachet 20 ml pour 8l d'eau, temps de contact 15 min -Surfa'Safe Premium® (équipements, petites surfaces) : temps de contact 5 min A la sortie du patient : <ul style="list-style-type: none"> - En l'absence de traitement d'air : aérer la chambre 15 min avant le bionettoyage - Double bionettoyage selon procédure habituelle
	Patient	Port d'un masque chirurgical avant de quitter la chambre Visites : uniquement sur autorisation médicale