

Transport interne du patient suspect ou confirmé Covid-19

Date d'application : mars 2020

Réf : FTEC-XXXX

Version 1 : 26/03/2020

Page 1

PROBLEMATIQUE	Indications	Patient suspect ou confirmé de Covid-19
	Réservoir	Voies respiratoires : sécrétions pharyngées et bronchiques Excrétions biologiques : selles diarrhéiques
	Voies de transmission	Respiratoire Conjonctive Mains, matériel et environnement contaminés
ORGANISATION	Tenue professionnelle	Tenue professionnelle propre habituelle (changement quotidien ou pyjama à UU)
	Equipement de protection individuelle (EPI)	<ul style="list-style-type: none"> - Masque chirurgical - Surblouse - Tablier plastique (bionettoyage et si contact avec des liquides biologiques) - Gants(bionettoyage et si contact avec des liquides biologiques)
	Matériel	<ul style="list-style-type: none"> - Produit hydro-alcoolique - Drap à UU ou textile pour le brancard - Sac DASRIa - Produit détergent-désinfectant, chiffonnettes à UU, lingettes pré-imprégnées
	Avant la prise en charge du patient	<p>Accompagné d'un professionnel du service</p> <p>Patient : Le service fournit le masque chirurgical au patient <ul style="list-style-type: none"> - Mettre un masque chirurgical, maintenu en place tout au long du transport et jusqu'à l'installation dans le service destinataire (hospitalisations, plateaux techniques, consultations, imageries, etc...) </p> <p>Ambulanciers: <ul style="list-style-type: none"> - Réaliser une FHA - Mettre une surblouse - Mettre un masque chirurgical - Réaliser une FHA - Disposer un drap à usage unique ou textile sur le brancard - Installer le patient </p>
	Après prise en charge du patient	<p>Dans le service destinataire (hospitalisations, imageries, consultations, etc...):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réaliser une FHA - Installer le patient - Retirer la surblouse (éliminer en DASRIa) - Réaliser une FHA <p>A la fin de la prise en charge : <ul style="list-style-type: none"> - Garder le masque chirurgical (maintenu 4h, le retirer si souillé et FHA) - Mettre un tablier plastique à UU et des gants à UU - Réaliser le nettoyage du brancard avec un produit détergent-désinfectant - Retirer et éliminer le tablier plastique et les gants (DASRIa) - Réaliser une FHA </p>
	En fin de service	Procédure de bionettoyage habituelle Traçabilité
ENVIRONNEMENT	Déchets	DASRIa
	Linge	Circuit habituel
	Bionettoyage	<ul style="list-style-type: none"> - Surfa'Safe Premium®, lingettes Septalkan® (équipements, petites surfaces) : temps de contact 5 min - Surfanios Premium® : sachet 20 ml pour 8l d'eau, temps de contact 15 min