

Précautions complémentaires Gouttelettes et Contact : Covid-19
Bloc opératoire/secteurs interventionnels – Anesthésie – Salle surveillance post-interventionnelle (SSPI)

Date d'application : mars 2020

Réf : FTEC-0368

Version 1 : 16/03/2020

Page 1 à 2

PROBLEMATIQUE	Indications	Patient suspect ou confirmé de Covid-19
	Réservoir	Voies respiratoires : sécrétions pharyngées et bronchiques Excrétions biologiques : selles diarrhéiques
	Voies de transmission	Respiratoire Conjonctive Mains, matériel et environnement contaminés
	Durée des mesures	Arrivée au bloc opératoire jusqu'à la sortie de la SSPI
ORGANISATION	Salle d'opération	Sans modification du traitement d'air Nombre de personnes limité au minimum, sans sortie ni échange de personnels Fin intervention : respect cinétique décontamination particulière selon la classe ISO (ISO 6 ou 7 : env. 10 minutes- ISO 8 : env. 20 minutes)
	Information, signalétique	Affichage portes extérieures accès salle d'opération
	Organisation	Patient transféré directement en salle d'opération : ascenseur et couloir dégagés
	Suivi post-opératoire patient pauci-symptomatique	Séjour SSPI < 60 minutes ou anesthésie locorégionale/rachidienne - Surveillance en salle d'opération avant transfert direct dans la chambre Séjour SSPI > 60 minutes - Transfert du patient en SSPI avec masque chirurgical - Surveillance dans une pièce à part ou au minimum isolé avec un paravent
SOINS	Hygiène des mains	FHA à l'entrée, à la sortie de la salle d'opération, fréquence adaptée aux activités
	Equipement de protection individuelle	Accueil du patient au bloc opératoire - FHA - Blouse chirurgicale munie de poignets et manches imperméabilisés - Lunettes de protection, cagoule UU, masque chirurgical, gants non stériles Accès salle d'opération : équipe chirurgicale - Tunique/pantalon, cagoule UU, lunettes de protection - Masque chirurgical ou FFP (chirurgie OPH, ORL, maxillo-faciale, cardio-thoracique) - Vérifier l'étanchéité FFP par une inspiration forcée (fit check) - Désinfection chirurgicale par FHA + gants chirurgicaux (précautions standard : double gantage) Accès salle d'opération : équipe anesthésique : - Tunique/pantalon, cagoule UU, lunettes de protection - Masque chirurgical ou FFP (manœuvres respiratoires à risques) - Vérifier l'étanchéité FFP par une inspiration forcée (fit check) - FHA + gants UU non stériles ou stériles (selon activités) Avant sortie salle d'opération : - Retrait blouse chirurgicale/casaque, gants + FHA Après sortie salle d'opération : - Retrait lunettes, masque chirurgical ou FFP, cagoule + FHA
	Ventilation et aspiration	Filtre hydrophobe UU à haute capacité de filtration entre sonde intubation/masque facial et pièce en Y du circuit respiratoire Filtre supplémentaire au niveau de la valve expiratoire Remplacement des filtres après chaque patient Système d'aspiration endotrachéale clos équipé d'un filtre UU
ENVIRONNEMENT	Déchets	DASRIa (contenant adapté à la nature des déchets : sac jaune, collecteur PT, fût) Evacuation après chaque intervention
	Linge	Tri et circuits habituels
	Bionettoyage environnement et équipements	Environnement, équipements (colonne endoscopie, respirateur, scope, etc.) -Surfanios Premium® : sachet 20 ml pour 8l d'eau, temps de contact 15 min -Surfa'Safe Premium® (petits équipements) : temps de contact 5 min - Bionettoyage selon procédure habituelle des blocs Dispositifs médicaux réutilisables (instrumentation chirurgicale, endoscope, etc.) Selon procédure habituelle
	Patient (non ventilé)	Port d'un masque chirurgical pour tous les transferts (service/bloc opératoire/SSPI)